



Вы уверены, что Ваша кошка без глистов?

Многие владельцы не уверены в отсутствии гельминтов у кошек



Согласно недавнему * опросу, 66% владельцев кошек сказали, что они затрудняются давать таблетки от глистов своим кошкам. Кошка может отказаться принять таблетку, стать агрессивной или даже убежать. Кошка может выплюнуть таблетку, когда её владелец этого не увидел!



Вы можете получить уверенность в спот-он (наружном) применении

Профилактика и выведение гельминтов с помощью спот-он нанесения препарата фирмы Байер «Профендер®» - это легко и просто, потому что раствор наносится непосредственно на кожу кошки в одну точку. Активные ингредиенты через кожу проникают в кишечник, где уничтожают гельминтов – нематод (токсокар, токсаскарид, анкилостом) и цестод (тениид, дипилидий, зхинококков).



Как выполнить спот-он нанесение препарата Профендер®

1. Возьмите одну пипетку из упаковки.
2. Держите пипетку в вертикальном положении.
3. Снимите защитный колпачок с пипетки, и расположив её вертикально, проколите защитную мембрану носика пипетки (надев колпачок обратной стороной), затем снимите колпачок.
4. Содержимое пипетки «Профендер®» наносят на кожу, раздвинув шерсть между лопатками у основания шеи животного, так как это место недоступно для слизывания.






Почему важны регулярные обработки от гельминтов?



Большинство гельминтов находятся в кишечнике и могут вызвать проблемы со здоровьем у вашей кошки. Они могут также заражать людей, а также других животных, что является еще одной причиной, чтобы проводить регулярно профилактику.

Регулярные обработки от глистов помогают предотвратить их распространение

Важно уничтожить гельминтов прежде, чем они достигли зрелости и начали производить большое количество яиц.



Как часто нужно проводить обработки моего питомца?

В идеале, кошки должны быть обработаны, по крайней мере, каждые 3 месяца. Ежемесячные обработки рекомендуются для кошек, которые регулярно охотятся, так как они могут ловить птиц и мышей, которые могут быть заражены круглыми или ленточными глистами. Регулярные обработки препаратом «Профендер®» против гельминтов не только уничтожают глистов, но также помогают уменьшить количество яиц, которые попадают в окружающую среду.

Насколько это безопасно для использования у беременных или кормящих кошек?

Препарат «Профендер®» является безопасным для использования даже у беременных или кормящих кошек.

В каком возрасте следует начинать обработку от гельминтов моему котенку?

Любой вновь приобретенный котенок должен быть обработан от глистов. Котята должны быть обработаны в возрасте 8 недель, при дальнейшем лечении каждые 3 месяца. «Профендер®» является безопасным средством для использования у котят с 8-недельного возраста. Дегельминтизацию кошек с использованием «Профендер®» необходимо проводить дозировкой, согласно массы тела животного.

Вся информация о Профендер® на сайте

[\(кликните сюда\)](#)

profender
SPOT-ON

